

Elektrokemoterapija v kliniki, petek, 16. januar 2026, 16:30-17:30

Lokacija: predavalnica P2

Sekcija: Elektrokemoterapija v kliniki

Predsedujoča: Dimitrij Kuhelj in Gregor Serša

OR-20

Long term rezultati ECT pri zdravljenju BCC

Aleš Grošelj

Onkološki inštitut Ljubljana, Slovenija

Elektrokemoterapija (EKT) se je v zadnjem desetletju uveljavila kot učinkovito in varno zdravljenje bazalnoceličnega raka (BCC), predvsem v estetsko in funkcionalno občutljivih predelih glave in vratu ter pri starejših bolnikih z več pridruženimi boleznimi. Analiza podatkov iz Insp-ECT registra je pokazala visoko stopnjo lokalne kontrole bolezni že po enkratnem zdravljenju z EKT, z 92-odstotnim petletnim preživetjem brez ponovitve. Ponovitve so bile redke in v večini primerov uspešno zdravljenje s ponovno EKT, kirurškim posegom ali obsevanjem, kar potrjuje dolgotrajno učinkovitost zdravljenja.

Dodatno je raziskava, usmerjena v deeskalacijo odmerka bleomicina, pokazala, da zmanjšan odmerek bleomicina (10.000 IU/m²) zagotavlja primerljivo učinkovitost s standardnim odmerkom (15.000 IU/m²). Pri bolnikih z nižjim odmerkom je bilo sicer zabeleženih nekoliko več poznih ponovitev, ki so bile uspešno zdravljenje z dodatno EKT s standardnim odmerkom bleomicina.

Rezultati potrjujejo, da EKT predstavlja učinkovito in varno zdravljenje primarnih in ponavljajočih BCC. Prilagoditev odmerka bleomicina je pomembna predvsem pri starejših bolnikih s slabšo ledvično funkcijo in omogoča individualiziran pristop zdravljenja z EKT.